VeaVet Hépatique Spray 20 ml | 20 ml

Manufacturer	VeaVet
Product number	1830
Weight	0.02kg
Length	28mm
Width	28mm
Height	102mm

Product description

Produit de soin pour chiens, chats, lapins et rongeurs

En cas de protection réduite de la peau en regard des fongi et les acariens de l'herbe

VeaVet Hépatique Spray est un produit de soin pour la peau et la fourrure à base d'hépatique, de ciste et d'huiles nourrissantes qui favorisent la régénération naturelle des peaux stressées. La peau est renforcée dans son autorégulation par les ingrédients qui améliorent la flore cutanée. La colonisation des micro-organismes, des fongi et des acariens de l'herbe sur la peau est rendue plus difficile. Les ingrédients apaisants réduisent les démangeaisons et les rougeurs de la peau. La peau peut à nouveau remplir sa fonction protectrice en tant qu'organe frontalier avec le monde extérieur.

Une flore cutanée fonctionnelle est toujours colonisée par certains microorganismes tels que les bactéries et les fongi. S'ils sont en équilibre, ils garantissent que la peau est intacte en tant qu'organe frontalier avec le monde extérieur. Grâce à leurs produits métaboliques, ils optimisent la valeur du pH et rendent difficile la colonisation par les microorganismes pathogènes, des fongi et des acariens de l'herbe. Si cet organe important est déséquilibré par des influences intérieures ou extérieures, une colonisation fautive de la flore cutanée peut se produire.

Influences intérieures:

- Système immunitaire affaibli (également en fonction de la phase de la vie - animal très vieux ou jeune)
- Une sensibilité accrue aux acariens de l'herbe en raison d'une prédisposition génétique

Influences extérieures:

- Contact direct avec des chiens ou des chats infectés
- Contact avec des ustensiles de soins contaminés par des fongi, par ex. brosses ou peignes
- Ambiance (un climat chaud et humide peut affaiblir/influencer défavorablement la flore cutanée)
- Les blessures d'entrée existantes peuvent favoriser la colonisation

Mesures pour réduire les influences extérieures:

- Désinfection des couchettes
- Désinfection de l'ambiance (gamelles, jouets, etc.)
- Lavage et désinfection des couvertures
- Éviter tout contact avec les animaux infectés (quarantaine / séparation)
- La lumière, l'air et le soleil sont les ennemis naturels du fongus de la peau - garantir une faire suffisamment d'exercice à l'air frais

Tuyau d'experte: En cas de susceptibilité accrue aux colonisations fongiques, une attention particulière doit être accordée à l'alimentation et à l'apport optimal en micronutriments (**HuminoMineral**). Si le besoin n'est pas satisfait, la régénération de la peau, la stabilité de la peau et la formation d'une nouvelle peau sont perturbées et la peau devient sensible aux parasites. Une alimentation en micronutriments adapté au besoin et et le soutien par des acides gras oméga-3 (**Bio Fourrure & Peau Vital Huile**) provenant d'huiles de haute qualité sont significantes pour une régénération rapide.
Étant donné qu'un fongus cutané externe donne souvent l'indication d'une infestation par des fongi intestinaux, une remédiation intestinale avec soutien simultané des organes métaboliques (foie et reins) peut être très judicieuse (https://cdvet.sharepoint.com/:b:/s/shares/EWGT7LwNXVdFnI03Z_ORGEcBhsf_N440Hs3ApsFK4R79ug?e=8pocRT).

Additional information

PZN DE	16830169
PZN AT	5382532
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut	Nein