EquiGreen Tonique pour Sabot 250 ml | 250 ml



Manufacturer	EquiGreen®
Product number	6001
Weight	0.247kg
Length	62mm
Width	62mm
Height	137mm

Product description

Aliments complémentaires pour chevaux

Soutien conditionné fourrager du métabolisme du sabot, liquide

Les sabots supportent l'activité de la circulation sanguine chez le cheval. La grande surface du sabot s'accompagne d'une circulation sanguine active. À chaque pas, la surface des sabots s'étend, activant ainsi une circulation sanguine optimale. Les substances nocives et les résidus métaboliques sont excrétés par la corne nouvellement formée, ce qui peut être reconnu par les anneaux ou les décolorations de la corne. Ainsi, le sabot avec son corium est un organe d'importance vitale et métaboliquement actif. Si le mécanisme du sabot fonctionne bien, le métabolisme du sabot est en équilibre. Lorsque le mécanisme du sabot est restreint, le sang s'accumule et ne peut plus soutenir l'activité de la circulation sanguine dans le corps. Avec un mécanisme de sabot restreint, qui s'accompagne d'une circulation sanguine réduite, l'augmentation des substances nocives et des résidus métaboliques doit être excrétés du corps par le foie et les reins.

Les causes fréquentes de déséquilibre du métabolisme des sabots sont une alimentation incorrecte, une sollicitation inadéquate des sabots, l'obésité et les maladies métaboliques. **EquiGreen Tonique pour Sabot** est spécialement aligné sur les besoins aromatiques des chevaux et des poneys dans ce contexte.

Composition: extrait d'ortie, extrait de bouleau, extrait de pensée sauvage, extrait de souci, extrait d'arnica des montagnes

Additifs par L: Conservateurs: acide lactique E270 47,5 g. Additifs sensoriels: teinture de ginkgo 70,88 g, teinture de Chardon-Marie 23,62 g, teinture de verge d'or 23,62 g.

Constituants analytiques et teneurs: protéine brute 0,3%, cellulose brute 0,5%, cendres brutes 0,4%, matière grasse brute 0,2%, humidité 93%, sodium 0,02%

Recommandation d'alimentation: Agiter avant l'utilisation. Au besoin, mélanger 5-10 ml 2 x par jour avec la nourriture ou donner directement dans la bouche. Pendant toute la saison de pâturage 1 x par jour 2-5 ml.

Additional information

PZN DE	17512738
PZN AT	5463489
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut	Nein