

MicroAgricole MK (Vache laitière) 25kg

Manufacturer



Product number 10007

Weight 25kg

Length 430mm

Width 200mm

Height 800mm



Product description

Aliment minéral pour vaches laitières

L'approvisionnement de micronutriments avec des levures vivantes EXTRA - favorise l'efficacité de la production laitière

Pour les vaches laitières en début de lactation et lors de périodes de haute production, l'apport en énergie joue un rôle important dans le régime alimentaire. Les carences en éléments nutritifs doivent être tenue le plus faible possible après la mise bas pour assurer un potentiel de production de lait au maximum.

Avantages de **MicroAgricole MK**:

- Meilleure conversion des aliments optimisant l'échange d'ions cellulaire
- Améliore l'approvisionnement en micronutriments et de l'alimentation de base
- Réduit la teneur en protéines brutes par la stimulation du métabolisme des protéines = économie des porteurs de protéines
- Meilleure air dans les étables par le soutien métabolique et la liaison des toxines dans l'intestin

Il suit:

- Permet d'optimiser la condition de la panse
- Condition saine de la mamelle
- Griffes en bonne santé
- Fertilité améliorée
- Longue durée de vie

Effet de la levure vivante:

Par l'activité métabolique de la levure vivante, des nutriments spéciaux tels que les acides gras, acides aminés et vitamines sont produits dans la panse, qui soutiennent spécifiquement les bactéries de la panse. Un effet secondaire favorise une forte augmentation de bactéries, qui dégradent les bactéries d'acide lactique dans la panse et ainsi maintiennent la valeur du pH stable. En outre, les bactéries sont encouragées à décomposer la cellulose dans la panse et à augmenter la digestibilité de la fibre brute. Plus d'acides gras volatils sont produits qui augmentent la formation de glucose sanguin et la digestion des aliments de base.

Par une meilleure digestion alimentaire de base, la production laitière de la vache peut être augmentée. Après que des expériences ont été faites, des augmentations significatives de production laitière, entre le 50e et 150e jour de la lactation, ont été observées. En particulier chez les vaches âgées avec au moins 2 lactations.

Composition: maërl, levure de bière, farine d'algues de marines, farine de pépins de raisin, radicules de malt, ortie, chardon-Marie

Additifs par kg:

additifs technologiques: bentonite 1m558i 289g, clinoptilolite d'origine sédimentaire 1g568 289g. Stabilisateurs de la flore intestinale: 4b1710 saccharomyces cerevisiae MULC 39885-495 x 10 ^ 9 CFU

Constituants analytiques et teneurs:

Protéines brutes 4,4%, fibres brutes 3,8%, cendres brutes 72,7%, matières grasses brutes 0,2%, sodium 0,80% , calcium 6,75%, phosphore 0,10%, magnésium 0,85%, cendres dans HCl 50,9%

Quantités recommandées:

80-150 g **MicroAgricole MK** par animal et jour (min. d'une concentration ajoutée 2,0 x 10 ^ 9 UFC par kg d'aliment complet)

La quantité totale de bentonite ne doit pas dépasser la teneur maximale autorisée de 20000mg / kg d'aliment complet.

La quantité totale de clinoptilolite d'origine sédimentaire de toutes les sources ne doit pas dépasser la teneur maximale autorisée de 10000mg / kg aliment complet.

Veuillez éviter l'administration simultanée des macrolides par voie orale

Additional information

Gefahrstoff Nein

Gefahrgut Nein